

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΕΠΙ 1186 ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΩΝ

Θ ΠΑΥΛΙΔΗΣ, Χ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Π ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ, Θ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ,
Σ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Ι ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, Α ΚΟΥΒΕΛΑΣ, S JANCONIC
ΑΠΟ ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (Β' ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η χολολιθίαση είναι συχνή πάθηση και η αντιμετώπισή της ποικίλλει.

Κατά την τελευταία 10ετία διενεργήσαμε 1186 χολοκυστεκτομές περιλαμβανομένων και 12 λαπαροσκοπικών σε σύνολο 5556 επεμβάσεων (ποσοστό 21%). Αφορούσαν κυρίως σε γυναίκες (ποσοστό 74%) ηλικίας 21-92 ετών (μ.ο. 57±10). Σε 978 περιπτώσεις εκτελέσθηκε απλή χολοκυστεκτομή (ποσοστό 82%), ενώ σε 208 περιπτώσεις απαιτήθηκε διερεύνηση του χοληδόχου πόρου (ποσοστό 18%) και ακολούθησε τοποθέτηση Kehr σε 171 περιπτώσεις, χοληδοχο-δωδεκαδακτυλική αναστόμωση σε 29 και σφιγκτηροπλαστική σε 8 περιπτώσεις.

Το ποσοστό νοσηρότητας και θνητότητας ήταν 7% και 1%, αντιστοίχως. Η ιστολογική εξέταση της χοληδόχου κύστης έδειξε χρόνια χολοκυστίτιδα (81%), οξεία χολοκυστίτιδα (4%), υπερπλαστική χολοκυστοπάθεια (13%) και καρκίνωμα (1.65%).

Συμπεραίνεται, ότι η χολοκυστεκτομή είναι απλή και ασφαλής επέμβαση ιδιαίτερα σε ανεπίπλοκες καταστάσεις και σε νεότερες ηλικίες και πρέπει να αποτελεί τη μέθοδο εκλογής στην αντιμετώπιση της χολολιθίασης μετά μάλιστα και την εισαγωγή της λαπαροσκοπικής τεχνικής.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η χολολιθίαση είναι συχνή πάθηση. Υπολογίζεται, ότι περίπου το

10-20% του ενήλικου πληθυσμού στις αναπτυγμένες χώρες έχουν χολολίθους. Η αναλογία είναι υψηλότερη στις γυναίκες, τα παχύσαρκα άτομα

